

## ANNEXE 1 : DETAIL DES ZNIEFF SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

Nom du site	Communes concernées (sur le territoire)	Description du site	Habitats et espèces déterminantes
<b>ZNIEFF de type I</b>			
<p><b>Pinèdes, bois et pelouses au nord de Clairizet, à l'ouest de Vrigny et au sud de Janvry</b></p>	<p>Saint-Euphraise-et-Clairizet ; Janvry ; Gueux ; Vrigny ; Coulommès-la-Montagne</p>	<p>La ZNIEFF des pinèdes, bois et pelouses au nord de Clairizet, à l'ouest de Vrigny et au sud de Janvry est située dans le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. Initialement constituée par les pelouses du relais PTT, elle a fortement été agrandie en 2000. On y distingue des secteurs très secs et des secteurs plus humides, des végétations forestières, arbustives et herbacées. La pinède calcicole est le groupement dominant. Cette zone est dans un bon état en général.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Habitats</b></p> <p>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides ; Forêts de Pins sylvestres ; Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</p> <p style="text-align: center;"><b>Espèces</b></p> <p><u>Lépidoptères</u> : Le Flambé <i>Iphiclides podalirius</i> ; Le Machaon <i>Papilio machaon</i> ; La Thécla du Prunier <i>Strymonidia pruni</i></p> <p><u>Orthoptères</u> : Oedipode turquoise <i>Oedipoda caerulescens</i> ; Decticelle grisâtre <i>Platycleis albopunctata</i> ; Tétrix des carrières <i>Tetrix nutans</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : <i>Chamaecytisus supinus</i> ; Orobanche violette <i>Orobanche amethystea</i></p> <p><u>Reptiles</u> : Coronelle lisse <i>Coronella austriaca</i></p>
<p><b>Le Bois de la Fosse à Sacy</b></p>	<p>Écueil ; Ville-Dommange ; Sacy</p>	<p>La ZNIEFF du Bois de la Fosse recouvre le plateau du Tertiaire parisien et ses versants escarpés. Les types forestiers très classiques sont la chênaie sessiliflore et la chênaie-charmaie mésotrophe sur le plateau ainsi que la hêtraie-chênaie plus ou moins sèche sur les pentes. On y trouve aussi des forêts hygrophiles ponctuelles dans les lieux humides et des plantations de pins à goodyère rampante et pyrole à feuilles rondes. Mais l'originalité du site est surtout due à la présence de végétations d'ourlets thermophiles développés, de pelouses calcaires et de suintements tufeux en bordure de la ZNIEFF. Les pelouses et lisières de la ZNIEFF sont dans un état précaire, dégradées par la pratique du moto-cross et par les activités liées à l'agriculture (dépôts de terre, de matières organiques, de matériaux et matériels divers, anthropisation des lisières et pelouses situées en</p>	<p style="text-align: center;"><b>Habitats</b></p> <p>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) ; Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles ; Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides ; Hêtraies sur calcaire ; Sources d'eaux dures</p> <p style="text-align: center;"><b>Espèces</b></p> <p><u>Phanérogames</u> : Catabrose aquatique <i>Catabrosa aquatica</i> ; <i>Chamaecytisus supinus</i> ; Gymnadenie odorante <i>Gymnadenia odoratissima</i> ; Spéculaire miroir de Vénus <i>Legousia hybrida</i> ; Lin des Alpes <i>Linum leonii</i> ; Chèvrefeuille des jardins <i>Lonicera caprifolium</i> ; Euphrase jaune <i>Odontites luteus</i> ; Orobanche violette <i>Orobanche amethystea</i> ; Grande Orobanche <i>Orobanche elatior</i> ; Parnassie des marais <i>Parnassia palustris</i> ; Grassette commune <i>Pinguicula vulgaris</i> ; Valérianelle sillonnée <i>Valerianella rimosa</i></p>

		bordure des vignes). L'état général n'est donc qu'assez moyen, surtout au niveau de la lisière est.	
<b>Forêt Domaniale de Sermiers et Bois des Chauffours à Villers-Allerand</b>	Sermiers ; Villers-Allerand	La ZNIEFF de la Forêt Domaniale de Sermiers et du Bois des Chauffours se situe en bordure du Massif forestier de la Montagne de Reims entre les villages de Sermiers et de Villers-Allerand, à quelques kilomètres au sud de Reims. La végétation de la ZNIEFF est en majorité forestière et recense plusieurs types de boisement caractéristiques du secteur ; elle comprend également un réseau de petites mares, un marais de pente, une pelouse calcaire en voie de boisement de type moliniaie et une prairie pâturée. La ZNIEFF, qui fait partie du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, est traversée sur sa largeur par un chemin de randonnée (G.R.142) ; elle est dans un bon état général de conservation.	<p><b>Habitats</b></p> <p>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) ; Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles ; Prairies à Molinie et communautés associées ; Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Phanérogames</u> : Parnassie des marais <i>Parnassia palustris</i> ; Cassis <i>Ribes nigrum</i></p> <p><u>Ptéridophytes</u> : Prêle d'hiver <i>Equisetum hyemale</i> ; Osmonde royale <i>Osmunda regalis</i> ; Fougère des marais <i>Thelypteris palustris</i></p>
<b>Bois de la Charmoise, des bâtis et forêt communale à Verzenay, Verzy et Prunay</b>	Verzenay ; Verzy	La ZNIEFF des bois de la Charmoise et des Bâtis occupe un plateau et une partie de ses pentes au sud des villages de Verzenay et de Verzy. Elle a été légèrement agrandie en 2000 vers l'est pour prendre en compte la mare du parking des pins qui possède une fougère protégée au niveau régional, le thélyptéris des marais (également inscrit sur la liste rouge des végétaux menacés de Champagne-Ardenne).	<p><b>Habitats</b></p> <p>Landes sèches ; Bas-marais acides ; Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais ; Végétations aquatiques ; Communautés amphibies</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Amphibiens</u> : Sonneur à ventre jaune <i>Bombina variegata</i> ; Salamandre tachetée <i>Salamandra salamandra</i> ; Triton crêté <i>Triturus cristatus</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Rossolis à feuilles rondes <i>Drosera rotundifolia</i> ; Raiponce noire <i>Phyteuma nigrum</i> ; Pyrole moyenne <i>Pyrola media</i> ; Rubanier nain <i>Sparganium minimum</i></p> <p><u>Ptéridophytes</u> : Fougère des marais <i>Thelypteris palustris</i></p>
<b>Bois des Hauts-Balais et Marais du Clos au nord de Courcelles-Sapicourt</b>	Muizon ; Courcelles-Sapicourt	La ZNIEFF du Bois des Hauts Balais et du marais du Clos est située entre Courcelles-Sapicourt et Muizon, au nord-ouest de Reims, dans le département de la Marne. Elle regroupe une des six tourbières alcalines (sur tourbe) de la région naturelle du Tadernois, des petites pelouses sur les zones sablonneuses environnantes plus sèches et	<p><b>Habitats</b></p> <p>Prairies à Molinie et communautés associées ; Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) ; Chênaies acidiphiles ; Végétation à <i>Cladium mariscus</i> ; Pelouses siliceuses ouvertes médio européennes</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Amphibiens</u> : Alyte accoucheur <i>Alytes</i></p>

		<p>différents groupements forestiers. Cette ZNIEFF est un des sites importants du département de la Marne ; elle a été proposée, avec neuf autres ZNIEFF dans le cadre de la directive Habitats (site n°29 : marais et pelouses du tertiaire au nord de Reims). Elle est en bon état mis à part les abords de la N. 31 souillés par les visiteurs (proximité de Reims) et promeneurs (déchets, feux de camp...). Le Bois des Hauts Balais est fortement fréquenté.</p>	<p><i>obstetricans</i> ; Salamandre tachetée <i>Salamandra salamandra</i></p> <p><u>Coléoptères</u> : Cicindèle hybride <i>Cicindela hybrida</i></p> <p><u>Lépidoptères</u> : Le Petit Agreste <i>Arethusana arethusana</i> ; L'Azuré de la Croisette <i>Maculinea alcon</i></p> <p><u>Mammifères</u> : Crossope aquatique <i>Neomys fodiens</i></p> <p><u>Odonates</u> : Le Cordulégastré annelé <i>Cordulegaster boltoni</i></p> <p><u>Oiseaux</u> : Rousserolle verderolle <i>Acrocephalus palustris</i> ; Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio</i></p> <p><u>Orthoptères</u> : Criquet verte-échine <i>Chorthippus dorsatus</i> ; Criquet palustre <i>Chorthippus montanus</i> ; Criquet des Pins <i>Chorthippus vagans</i> ; Criquet des Genévriers <i>Chrysochraon brachyptera</i> ; Conocéphale des Roseaux <i>Conocephalus dorsalis</i> ; Criquet ensanglanté <i>Mecostethus grossus</i> ; Decticelle des bruyères <i>Metrioptera brachyptera</i> ; Gomphocère tacheté <i>Myrmeleotettix maculatus</i> ; Oedipode turquoise <i>Oedipoda caerulescens</i> ; Criquet rouge-queue <i>Omocestus haemorrhoidali</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Canche caryophyllée <i>Aira caryophylla</i> ; Mouron délicat <i>Anagallis tenella</i> ; Laïche des sables <i>Carex arenaria</i> ; Laïche divisée <i>Carex divisa</i> ; Orchis incarnat <i>Dactylorhiza incarnata</i> ; Orchis négligé <i>Dactylorhiza praetermissa</i> ; Linaigrette à feuilles larges <i>Eriophorum latifolium</i> ; Cotonnière naine <i>Filago minima</i> ; Héliotrope d'Europe <i>Heliotropium europaeum</i> ; Trèfle d'eau <i>Menyanthes trifoliata</i> ; Mibora naine <i>Mibora minima</i> ; Oenanthe de Lachenal <i>Oenanthe lachenalii</i> ; Ornithope délicat <i>Ornithopus perpusillus</i> ; Parnassie des marais <i>Parnassia palustris</i> ; Grassette commune <i>Pinguicula vulgaris</i> ; Trèfle strié <i>Trifolium striatum</i> ; Vesce jaune <i>Vicia lutea</i> ; Violette des chiens <i>Viola canina</i></p>
<p><b>Pinèdes et Garenne de Mont-Aigu et du Champ la Vache entre Beine-Nauroy et Pontfaverger-Moronvilliers</b></p>	<p>Beine-Nauroy ; Selles ; Pontfaverger-Moronvilliers</p>	<p>La ZNIEFF des pinèdes et garenne de Mont Aigu et du Champ la Vache est située entre Beine-Nauroy et Pontfaverger-Moronvilliers, dans la région naturelle de Champagne crayeuse. Les boisements sont de deux types : pinèdes de pins sylvestres et de pins noirs et</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles ; Forêts de Pins sylvestres ; Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides ; Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</p>

		<p>chênaie pubescente. La garenne et les pinèdes sont en bon état, mais sont progressivement dégradées par les pratiques agricoles et sylvicoles (lisières menacées par les projections de produits phytosanitaires des cultures environnantes, plantations et vieillissement des peuplements forestiers avec fermeture du milieu, etc.).</p>	<p><b>Espèces</b></p> <p><u>Lépidoptères</u> : La Mélitée noirâtre <i>Melitaea diamina</i> ; La Mélitée de la Lancéole <i>Mellicta parthenoides</i> ; Le Machaon <i>Papilio machaon</i></p> <p><u>Orthoptères</u> : Oedipode turquoise <i>Oedipoda caerulea</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Épipactis de Müller <i>Epipactis muelleri</i> ; Laser à feuilles larges <i>Laserpitium latifolium</i> ; Lin des Alpes <i>Linum leonii</i> ; Orobanche du thym <i>Orobanche alba</i> ; Chêne pubescent <i>Quercus pubescens</i></p>
<p><b>Bois des bâtis de Puilsieux et Bois des ronces à Mailly-Champagne</b></p>	<p>Mailly-Champagne</p>	<p>La ZNIEFF des bois des Bâtis de Puilsieux et des Ronces est située entre les villages de Mailly-Champagne et de Louvois, dans le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. Essentiellement forestière, elle fait partie de la grande ZNIEFF de type II du massif boisé de la Montagne de Reims : on y rencontre les principaux types forestiers du secteur, mais aussi certaines pelouses et lisières forestières thermophiles bien caractérisées. La ZNIEFF est dans un bon état de conservation.</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles ; Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides ; Hêtraies sur calcaire</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Phanérogames</u> : Asaret <i>Asarum europaeum</i> ; Chamaecytisus <i>supinus</i> ; Gaillet de Fleurot <i>Galium fleurotii</i> ; Chêne pubescent <i>Quercus pubescens</i></p>
<p><b>Bois de Raray et de la Brusse à Dravegny et Arcis-le-Ponsart</b></p>	<p>Arcis-le-Ponsart</p>	<p>La ZNIEFF des bois de Raray et de la Brusse, d'une superficie de 112 hectares, est située à la limite des deux départements de la Marne et de l'Aisne, sur les communes de Dravegny et d'Arcis-le-Ponsart. Elle correspond à une butte-témoin de la Montagne de Reims qui domine d'environ 50 mètres le plateau environnant. Le bois, assez peu exploité, sans grande coupe, est très homogène et en bon état général.</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Chênaies acidiphiles ; Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Mammifères</u> : Grand rhinolophe <i>Rhinolophus ferrumequinum</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Iris fétide <i>Iris foetidissima</i></p>
<p><b>Le Bois du Moulinet et le vallon de Brise-tête à Saint-Gilles</b></p>	<p>Saint-Gilles</p>	<p>La ZNIEFF du Bois du Moulinet et du vallon de Brise-Tête est située au sud du village de Saint-Gilles, à la limite du département de la Marne et de l'Aisne. Le vallon raide et encaissé entaille profondément le plateau de la Brie champenoise pour rejoindre la vallée de l'Orillon. Une partie de celle-ci ainsi que le versant forestier exposé au nord près du Moulinet complètent le territoire de la ZNIEFF. Elle est dans un bon état général de conservation.</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides ; Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens ; Sources d'eaux dures</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Odonates</u> : L'Aeschne printanière <i>Brachytron pratense</i> ; Le Cordulégastre annelé <i>Cordulegaster boltoni</i></p> <p><u>Oiseaux</u> : Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio</i></p>

			<p><u>Phanérogames</u> : <i>Chamaecytisus supinus</i> ;  <i>Ophrys abeille Ophrys sphegodes</i> ; <i>Cassis</i>  <i>Ribes nigrum</i></p> <p><u>Reptiles</u> : Lézard des souches <i>Lacerta agilis</i></p>
<p><b>Forêts et pelouses des Garennes et des Tournants à Villers-Marmery</b></p>	Villers-Marmery	<p>La ZNIEFF des bois et pelouses des Garennes et des Tournants est située au sud du village de Villers-Marmery, dans le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. Elle fait partie de la grande ZNIEFF de type II du massif boisé de la Montagne de Reims et comporte des forêts diverses, des pelouses, des groupements d'éboulis (au sud-est de la zone) ainsi que des lisières forestières thermophiles bien caractérisées. La ZNIEFF est dans un bon état général de conservation (la tempête du 26/12/99 a entraîné la formation de grandes trouées dans la forêt, ayant eu une action bénéfique pour la biodiversité végétale). Les pelouses ont malheureusement tendance à se refermer et à être colonisées par les ronces, les pins et les bouleaux. Cette ZNIEFF a été proposée pour le réseau Natura 2000, avec six autres, dans le cadre de la directive Habitats (site n° 67 : massif forestier de la Montagne de Reims - versant sud - et étangs associés).</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides ; Hêtraies sur calcaire ; Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles ; Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Phanérogames</u> : Cuscute à petites fleurs <i>Cuscuta epithimum</i> ; Gaillet de Fleurot <i>Galium fleurotii</i> ; Lin des Alpes <i>Linum leonii</i> ; Chêne pubescent <i>Quercus pubescens</i> ; Cormier <i>Sorbus domestica</i> ; Alisier de Fontainebleau <i>Sorbus latifolia</i> ; Violette des sables <i>Viola rupestris</i></p> <p><u>Reptiles</u> : Lézard des souches <i>Lacerta agilis</i></p>
<p><b>Bois et pelouses de la Cendrière à Trépail</b></p>	Villers-Marmery ; Trépail	<p>La ZNIEFF des bois et pelouses de la Cendrière est située au nord du village de Trépail, dans le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. Elle fait partie de la grande ZNIEFF de type II du massif boisé de la Montagne de Reims et comporte des forêts diverses, des pelouses et certaines lisières forestières thermophiles bien caractérisées. Son périmètre initial a été agrandi vers l'ouest pour prendre en compte la sablière (avec une lande à callune) et les pelouses situées au-dessus du terrain de sport. Outre son grand rôle paysager, le site présente également un certain intérêt géologique et géomorphologique (dolines de "la Cendrière"). La ZNIEFF a été proposée pour le réseau Natura 2000, avec six autres ZNIEFF, dans le cadre de la directive Habitats (site n° 67 : massif forestier de la Montagne</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Landes sèches ; Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides ; Hêtraies sur calcaire ; Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Phanérogames</u> : Marguerite de la Saint-Michel <i>Aster amellus</i> ; Laïche pied-d'oiseau <i>Carex ornithopoda</i> ; <i>Chamaecytisus supinus</i> ; Cuscute à petites fleurs <i>Cuscuta epithimum</i> ; Laser à feuilles larges <i>Laserpitium latifolium</i> ; Lin des Alpes <i>Linum leonii</i> ; Peucedan Herbe aux cerfs <i>Peucedanum cervaria</i> ; Raiponce noire <i>Phyteuma nigrum</i> ; Petite pyrole <i>Pyrola minor</i> ; Chêne pubescent <i>Quercus pubescens</i> ; Alisier de Fontainebleau <i>Sorbus latifolia</i> ; Violette des sables <i>Viola rupestris</i></p> <p><u>Reptiles</u> : Lézard des souches <i>Lacerta agilis</i></p>

		de Reims - versant sud - et étangs associés).	
<b>Bois Lapie à Aussonce et Pontfaverger-Moronvilliers</b>	Pontfaverger-Moronvilliers	La ZNIEFF du Bois Lapie est située entre les communes d'Aussonce (département des Ardennes) et de Pontfaverger (département de la Marne), dans la région naturelle de Champagne crayeuse. Elle est constituée par des plantations de pins laricio, de pins sylvestres, de pins noirs (plus localisées), des pinèdes en mélange avec des accrues feuillues classiques de la Champagne septentrionale, des pelouses clairsemées en cours de recolonisation végétale ou replantées en hêtre et des cultures et jachères (avec des plantations de pins très récentes). Cet espace naturel constitué de boisements variés situés au sein d'un secteur très cultivé, joue un rôle paysager fondamental, mais est appelé à évoluer.	<p><b>Habitats</b></p> <p>Forêts de Pins sylvestres ; Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Lépidoptères</u> : Le Fadet de la Mélique <i>Coenonympha glycerion</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Pyrole verdâtre <i>Pyrola chlorantha</i></p>
<b>Zone des Faux dans la forêt domaniale de Verzy</b>	Villers-Marmery ; Verzy	La ZNIEFF des Faux dans la forêt Domaniale de Verzy couvre une quarantaine d'hectares du plateau de la Montagne de Reims. La végétation de la ZNIEFF est variée : si la forêt domine largement, on y trouve aussi des chemins plus ou moins humides et des lisières ensoleillées. Cette ZNIEFF est située dans le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims ; elle fait l'objet d'une mise en Réserve Biologique Domaniale dirigée et fait aussi partie des sites classés selon la loi de 1930 (sur 13,5 hectares). Un parcours a été réalisé sur une petite partie du site et est très fréquenté par les touristes et promeneurs de plus en plus nombreux (d'où des problèmes de surfréquentation et d'étouffement des hêtres par tassement du sol). Néanmoins on peut considérer que la ZNIEFF est dans un bon état général.	<p><b>Habitats</b></p> <p>Chênaies acidiphiles</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Phanérogames</u> : Laïche des montagnes <i>Carex montana</i> ; Raiponce noire <i>Phyteuma nigrum</i> ; Alisier de Fontainebleau <i>Sorbus latifolia</i></p> <p><u>Reptiles</u> : Lézard des souches <i>Lacerta agilis</i></p>
<b>Bois des Grands Usages à Auménancourt et Pignicourt</b>	Auménancourt	La ZNIEFF du bois des Grands Usages abrite l'un des derniers exemplaires d'un groupement forestier autrefois plus répandu dans le secteur, la hêtraie thermophile de Champagne crayeuse (partie sud de la ZNIEFF), végétation climacique sur craie et graveluches, pratiquement éliminée de nos jours par les plantations	<p><b>Habitats</b></p> <p>Hêtraies sur calcaire ; Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides ; Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Lépidoptères</u> : Le Machaon <i>Papilio machaon</i></p>

		<p>résineuses et par la mise en culture (suite aux remembrements particulièrement dévastateurs de la région). Le reste de la ZNIEFF représente une phase pionnière à bouleau et à tremble. Les essences forestières sont variées : outre les pins sylvestres et les hêtres, on y rencontre également le bouleau verruqueux, le bouleau pubescent, le chêne pédonculé, le charme et le tremble. Leur structure assez claire et une physiologie ouverte ont permis à des groupements de lisières thermophiles (le long des layons forestiers) et de pelouses de perdurer.</p>	<p><u>Orthoptères</u> : Oedipode turquoise <i>Oedipoda caerulea</i>; Sténobothre bourdonneur <i>Stenobothrus nigromaculatus</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Anémone sauvage <i>Anemone sylvestris</i></p>
<p><b>Vallon du fond de la Gorge et plateau de la Barbarie à Savigny-sur-Ardres</b></p>	<p>Savigny-sur-Ardres</p>	<p>La ZNIEFF du vallon du fond de la Gorge et du plateau de la Barbarie est située à l'est du village de Savigny-sur-Ardres. D'une superficie de 188 hectares, elle comprend pour l'essentiel un grand vallon parcouru par un ruisseau, ses pentes et le rebord du plateau calcaire au lieu-dit la Barbarie. Les pentes les plus fortes, comme les anciennes carrières, sont le domaine des pelouses (lieu-dit "la Barbarie"), des prés-bois et des pinèdes. Plus bas, la pente s'adoucit et a permis l'installation de cultures de taille moyenne, de prairies mésophiles (de fauche et pâturées) et de boisements plus ou moins humides. A la Barbarie, les savarts constituent un paysage d'une grande valeur patrimoniale. La pelouse de la Barbarie est malheureusement dégradée par la pratique du moto-cross, le reste de la ZNIEFF est dans un état plus satisfaisant.</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens ; Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides ; Pelouses pionnières médio-européennes ; Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) ; Roselières</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Lépidoptères</u> : Le Flambé <i>Iphiclides podalirius</i> ; Le Machaon <i>Papilio machaon</i> ; La Thécla du Prunier <i>Strymonidia pruni</i></p> <p><u>Odonates</u> : Le Cordulégastré annelé <i>Cordulegaster boltoni</i></p> <p><u>Oiseaux</u> : Pipit farlouse <i>Anthus pratensis</i> ; Pigeon colombin <i>Columba oenas</i> ; Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio</i> ; Hirondelle de rivage <i>Riparia riparia</i></p> <p><u>Orthoptères</u> : Decticelle grisâtre <i>Platycleis albopunctata</i> ; Tétrix des carrières <i>Tetrix nutans</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Goutte de sang <i>Adonis annua</i> ; Mauve hérissée <i>Althaea hirsuta</i> ; Laïche humble <i>Carex humilis</i> ; <i>Chamaecytisus supinus</i> ; Orchis négligé <i>Dactylorhiza praetermissa</i> ; Gymnadenie odorante <i>Gymnadenia odoratissima</i> ; Jonc à fruits globuleux <i>Juncus sphaerocarpus</i> ; Lin des Alpes <i>Linum leonii</i> ; Bugrane naine <i>Ononis pusilla</i> ; Ophrys abeille <i>Ophrys sphegodes</i> ; Orobanche du thym <i>Orobanche alba</i> ; Orobanche violette <i>Orobanche amethystea</i> ; Orobanche de la picride <i>Orobanche picridis</i> ; Coqueret <i>Physalis alkekengi</i> ; Laiteron des marais</p>

			<i>Sonchus palustris</i> ; Orme lisse <i>Ulmus laevis</i>
<b>Pelouses du Fort Saint-Thierry, de Chenay et de Merfy</b>	Pouillon ; Merfy ; Chenay	Cette ZNIEFF est située au nord-ouest de Reims. C'est un ensemble de pelouses, fruticées et boisements de recolonisation installé sur le plateau et les pentes fortes qui surplombent les villages de Pouillon, Chenay et Merfy. Des constructions militaires désaffectées (anciennes fortifications) et d'anciennes carrières s'y remarquent. Le site est très fréquenté et dégradé par endroits par la pratique du moto-cross (non aménagé), par le piétinement et la surfréquentation (chemins et pelouses environnantes). Il a été proposé dans le cadre de la directive Habitats (site n° 29 : marais et pelouses du tertiaire au nord de Reims).	<p><b>Habitats</b></p> <p>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides ; Pelouses pionnières médio-européennes ; Fruticées à Genévriers communs ; Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Hémiptères</u> : Cigale des montagnes <i>Cicadetta montana</i></p> <p><u>Lépidoptères</u> : Le Flambé <i>Iphiclides podalirius</i></p> <p><u>Orthoptères</u> : Decticelle des bruyères <i>Metrioptera brachyptera</i> ; Oedipode turquoise <i>Oedipoda caerulea</i> ; Decticelle grisâtre <i>Platycleis albopunctata</i> ; Tétrix des carrières <i>Tetrix nutans</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Marguerite de la Saint-Michel <i>Aster amellus</i> ; Laïche humble <i>Carex humilis</i> ; Laïche pied-d'oiseau <i>Carex ornithopoda</i> ; Chamaecytisus <i>supinus</i> ; Baguenaudier <i>Colutea arborescens</i> ; Cuscute à petites fleurs <i>Cuscuta epithimum</i> ; Stramoine <i>Datura stramonium</i> ; Gymnadenie odorante <i>Gymnadenia odoratissima</i> ; Limodore avorté <i>Limodorum abortivum</i> ; Euphrase jaune <i>Odontites luteus</i> ; Ophrys abeille <i>Ophrys sphegodes</i> ; Orchis singe <i>Orchis simia</i> ; Orobanche violette <i>Orobanche amethystea</i> ; Orobanche de la germandrée <i>Orobanche teucrii</i> ; Braya couchée <i>Sisymbrium supinum</i> ; Alisier de Fontainebleau <i>Sorbus latifolia</i></p> <p><u>Reptiles</u> : Coronelle lisse <i>Coronella austriaca</i> ; Lézard des souches <i>Lacerta agilis</i></p>
<b>Pelouses et pinèdes de Chalons-sur-Vesle, de Merfy et de Chenay</b>	Châlons-sur-Vesle ; Merfy ; Chenay	La ZNIEFF regroupant les pelouses et pinèdes entre Châlons-sur-Vesle et Merfy résulte de la fusion de deux ZNIEFF (210000680 : pelouse de Merfy et 210000660 : pelouses de Châlons-sur-Vesle) et a été étendue aux anciens terrains de sport de Macô (pelouses sur sables), aux boisements périphériques et au Mont Chênois (site géologique : coupe du Thanétien de Châlons-sur-Vesle). La ZNIEFF possède un grand intérêt géologique et paléontologique. Elle a été	<p><b>Habitats</b></p> <p>Pelouses des sables calcaires ; Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes ; Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles ; Carrières</p> <p><b>Espèces</b></p> <p>Lépidoptères : Le Sphinx de l'Euphorbe <i>Hyles euphorbiae</i> ; Le Machaon <i>Papilio machaon</i> ; La Thécla du Prunier <i>Strymonidia pruni</i></p> <p>Orthoptères : Criquet des Pins <i>Chorthippus vagans</i> ; Gomphocère tacheté</p>

		présentée, avec dix autres ZNIEFF, dans le cadre de la directive Habitats (site n°29 : marais et pelouses du Tertiaire au nord de Reims). Très fréquenté par les touristes et surtout les Rémois, le site est néanmoins dans un bon état général de conservation.	<p><i>Myrmeleotettix maculatus</i> ; Oedipode turquoise <i>Oedipoda caerulea</i> ; Decticelle grisâtre <i>Platycleis albopunctata</i> ; Tétrix des carrières <i>Tetrix nutans</i></p> <p>Phanérogames : Alysson à calice persistant <i>Alyssum alyssoides</i> ; Armérie faux-plantain <i>Armeria alliacea</i> ; Armoise champêtre <i>Artemisia campestris</i> ; Brome à deux étamines <i>Bromus diandrus</i> ; Laïche divisée <i>Carex divisa</i> ; Laïche des bruyères <i>Carex ericetorum</i> ; Centaurée rude <i>Centaurea aspera</i> ; Chondrille à tige de jonc <i>Chondrilla juncea</i> ; Corynéphore blanchâtre <i>Corynephorus canescens</i> ; Chiendent pied-de-poule <i>Cynodon dactylon</i> ; Marrube commun <i>Marrubium vulgare</i> ; Luzerne naine <i>Medicago minima</i> ; Mibora naine <i>Mibora minima</i> ; Orobanche violette <i>Orobanche amethystea</i> ; Orobanche du trèfle <i>Orobanche minor</i> ; Silène conique <i>Silene conica</i> ; Silène cure-oreille <i>Silene otites</i> ; Véronique prostrée <i>Veronica prostrata</i> ; Véronique printanière <i>Veronica verna</i> ; Vulpie ambiguë <i>Vulpia ciliata</i></p>
<b>Ancienne Briqueterie de Breuil</b>	Breuil	L'ancienne briqueterie de Breuil et le Bois Planté qui lui fait suite font l'objet d'une ZNIEFF de type I de plus de 50 hectares. Elle regroupe surtout des pelouses récentes sur marnes, argile et sable, des bois de recolonisation et plus localement des végétations nitrophiles fraîches (surtout le long des chemins) et des groupements marécageux. Certains étangs présentent une végétation aquatique à potamot nageant et utriculaire citrine. Le site est dans un bon état général.	<p><b>Habitats</b></p> <p>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes ; Prairies à Molinie et communautés associées ; Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides ; Communautés à grandes Laïches ; Lisières humides à grandes herbes</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Autres</u> : <i>Ephydatia fluviatilis</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Corynéphore blanchâtre <i>Corynephorus canescens</i> ; Orchis négligé <i>Dactylorhiza praetermissa</i> ; Orobanche de la picride <i>Orobanche picridis</i> ; Laiteron des marais <i>Sonchus palustris</i></p>
<b>Pelouses et bois de la Garenne d'Écueil</b>	Écueil	La Garenne d'Écueil est située à l'est du village du même nom, dans le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. Elle comprend surtout des forêts feuillues (appelées aussi "garences"), ainsi que des pelouses et des fruticées de recolonisation. Le site a été proposé (avec neuf autres ZNIEFF) dans le cadre de la directive Habitats (site n°29 : marais et pelouses du tertiaire au nord de Reims). Son état général est moyen (présence notamment de tas de terre sur la pelouse).	<p><b>Habitats</b></p> <p>Pelouses des sables calcaires ; Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Lépidoptères</u> : Le Machaon <i>Papilio machaon</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Alysson à calice persistant <i>Alyssum alyssoides</i> ; Armérie faux-plantain <i>Armeria alliacea</i> ; Armoise champêtre <i>Artemisia campestris</i> ; <i>Chamaecytisus supinus</i> ; Chondrille à tige de jonc <i>Chondrilla juncea</i> ; Conopode dénudé</p>

			<p><i>Conopodium majus</i> ; Corynéphore blanchâtre <i>Corynephorus canescens</i> ; Cotonnière naine <i>Filago minima</i> ; Luzerne naine <i>Medicago minima</i> ; Mibora naine <i>Mibora minima</i> ; Herbe aux chats <i>Nepeta cataria</i> ; Orobanche violette <i>Orobanche amethystea</i> ; Phélypée des sables <i>Orobanche laevis</i> ; Orobanche du trèfle <i>Orobanche minor</i> ; Orobanche de la picride <i>Orobanche picridis</i> ; Berle des blés <i>Petroselinum segetum</i> ; Silène conique <i>Silene conica</i> ; Silène cure-oreille <i>Silene otites</i> ; Trèfle jaunâtre <i>Trifolium ochroleucon</i></p> <p><u>Reptiles</u> : Lézard des souches <i>Lacerta agilis</i></p>
<b>Pelouses du Fort de la Pompelle à Puisieux</b>	Puisieux	<p>La ZNIEFF du Fort de la Pompelle est située au nord de la commune de Puisieux, non loin de la ville de Reims. Elle est essentiellement constituée par des pelouses entourant le Fort de la Pompelle (devenu aujourd'hui un musée militaire). Bien que dégradées localement (création de grands parkings, chemins, travaux de terrassement en liaison avec le tournage d'un film), elles présentent toujours un intérêt biologique. La zone est dans un bon état général, si l'on fait abstraction des travaux mentionnés précédemment.</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Dalles rocheuses ; Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Lépidoptères</u> : Le Flambé <i>Iphiclides podalirius</i> ; L'Azuré de la Croisette <i>Maculinea alcon</i> ; La Thécla du Prunier <i>Strymonidia pruni</i></p> <p><u>Orthoptères</u> : Gomphocère tacheté <i>Myrmeleotettix maculatus</i> ; Tétrix des carrières <i>Tetrix nutans</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Lin des Alpes <i>Linum leonii</i> ; Orobanche du thym <i>Orobanche alba</i> ; Orobanche violette <i>Orobanche amethystea</i></p>
<b>Pelouse de la Husse à Prouilly</b>	Trigny, Prouilly	<p>La ZNIEFF de la Husse est située sur un coteau escarpé au sud-est du village de Prouilly, dans la région naturelle du Tadernois (Soissonois de la Marne). Elle comprend de très beaux secteurs de pelouses, des ourlets thermophiles, des groupements de recolonisation des carrières de calcaire, ainsi que des boisements feuillus et quelques pinèdes. Ses contours ont été modifiés en 1999 pour prendre en compte le talus sableux de la D.75 (station à géranium sanguin) au sud de la zone. Le site est en assez bon état, mais il est menacé par la proximité du vignoble (A.O.C. Champagne), la recolonisation forestière et la fréquentation humaine (aire de pique-nique, places à feux, présence de détritux au pied de la corniche).</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Carrières ; Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides ; Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles ; Forêts de Pins sylvestres</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Lépidoptères</u> : La Thécla du Prunier <i>Strymonidia pruni</i></p> <p><u>Orthoptères</u> : Decticelle grisâtre <i>Platycleis albopunctata</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Marguerite de la Saint-Michel <i>Aster amellus</i> ; Laïche humble <i>Carex humilis</i> ; Fumana à tiges retombantes <i>Fumana procumbens</i> ; Géranium sanguin <i>Geranium sanguineum</i> ; Bugrane naine <i>Ononis pusilla</i> ; Ophrys abeille <i>Ophrys sphegodes</i> ; Orobanche de la germandrée <i>Orobanche teucrii</i> ; Raiponce orbiculaire</p>

			<i>Phyteuma tenerum</i>
<b>Pelouses des Terres Blanches à l'est de Bouleuse</b>	Bouleuse ; Méry-Prémecy	La ZNIEFF des pelouses des Terres Blanches se situe à l'est du village de Bouleuse, dans le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. Elle est essentiellement constituée par des pelouses plus ou moins embroussaillées. Leur flore, bien diversifiée, est dominée par les graminées. Le site est en bon état.	<p><b>Habitats</b></p> <p>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Phanérogames</u> : <i>Chamaecytisus supinus</i></p>
<b>Pelouses de Branscourt</b>	Jonchery-sur-Vesle ; Branscourt ; Vandeuil	La ZNIEFF de la pelouse de Branscourt est située au nord-ouest de la commune du même nom et occupe le sommet d'un promontoire de la Côte de l'île de France autrefois dévolu à l'extraction de matériaux calcaires. Elle est encore en assez bon état, mais dégradée par la décharge qui prend de plus en plus de proportion et menacée par l'embroussaillage.	<p><b>Habitats</b></p> <p>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux ; Prairies à Molinie et communautés associées ; Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles ; Carrières ; Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Mammifères</u> : Murin de Bechstein <i>Myotis bechsteini</i> ; Murin à moustaches <i>Myotis mystacinus</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Céphalanthère à feuilles étroites <i>Cephalanthera longifolia</i> ; <i>Chamaecytisus supinus</i> ; Ophrys araignée <i>Ophrys sphegodes subsp. araneola</i> et <i>Ophrys sphegodes subsp. sphegodes</i> ; Orchis singe <i>Orchis simia</i> ; Chêne pubescent <i>Quercus pubescens</i></p>
<b>Les Grands Marais du Val de Vesle de Prunay à Courmelois</b>	Beaumont-sur-Vesle ; Sillery ; Verzenay ; Sept-Saulx ; Val-de-Vesle ; Prunay	La ZNIEFF dite des Grands Marais du Val de Vesle est située à quelques kilomètres au sud-est de Reims, en pleine Champagne crayeuse, entre Prunay et Sept-Saulx. Elle fait partie de la grande ZNIEFF II de la vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon. Elle constitue une ZNIEFF I de près de 400 hectares regroupant les milieux alluviaux les plus typiques du Val de Vesle (différents stades de la tourbière alcaline), les boisements et les quelques prairies et cultures présents sur le site. C'est de plus une zone paysagère qui joue un rôle fondamental dans l'équilibre de la vallée. Elle figure parmi les tourbières les plus importantes du département et regroupe les milieux les mieux conservés de la vallée. Diverses menaces pèsent donc sur elle, comme la dynamique naturelle (abandon du pâturage), le grignotage du	<p><b>Habitats</b></p> <p>Communautés à grandes Laïches ; Roselières ; Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) ; Végétation à <i>Cladium mariscus</i> ; Prairies à Molinie et communautés associées</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Amphibiens</u> : Alyte accoucheur <i>Alytes obstetricans</i> ; Rainette verte <i>Hyla arborea</i> ; Triton alpestre <i>Triturus alpestris</i> ; Triton crêté <i>Triturus cristatus</i></p> <p><u>Lépidoptères</u> : L'Azuré de la Croisette <i>Maculinea alcon alcon</i></p> <p><u>Mammifères</u> : Putois d'Europe, Furet <i>Mustela putorius</i> ; Murin de Daubenton <i>Myotis daubentoni</i> ; Murin à moustaches <i>Myotis mystacinus</i> ; Murin de Natterer <i>Myotis nattereri</i> ; Crossope aquatique <i>Neomys fodiens</i> ; Oreillard roux <i>Plecotus auritus</i></p>

		<p>marais par la culture (maraîchage en particulier) et par la plantation de peupliers, les dépôts de gravats divers, assèchement progressif de la nappe de la vallée, etc.</p>	<p><u>Odonates</u> : Le Cordulégastre annelé <i>Cordulegaster boltoni</i></p> <p><u>Oiseaux</u> : Phragmite des joncs <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> ; Cincle plongeur <i>Cinclus cinclus</i> ; Cochevis huppé <i>Galerida cristata</i> ; Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio</i> ; Pie-grièche grise <i>Lanius excubitor</i> ; Milan royal <i>Milvus milvus</i> ; Rougequeue à front blanc <i>Phoenicurus phoenicurus</i> ; Traquet tarier <i>Saxicola rubetra</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Mouron délicat <i>Anagallis tenella</i> ; Flûteau fausse-renoncule <i>Baldellia ranunculoides</i> ; Laïche paradoxale <i>Carex appropinquata</i> ; Orchis négligé <i>Dactylorhiza praetermissa</i> ; Gentiane des marais <i>Gentiana pneumonanthe</i> ; Oenanthe de Lachenal <i>Oenanthe lachenalii</i> ; Orchis des marais <i>Orchis palustris</i> ; Parnassie des marais <i>Parnassia palustris</i> ; Peucedan des marais <i>Peucedanum palustre</i> ; Grassette commune <i>Pinguicula vulgaris</i> ; Potamot des tourbières alcalines <i>Potamogeton coloratus</i> ; Grande douve <i>Ranunculus lingua</i> ; Saule à cinq étamines <i>Salix pentandra</i> ; Saule à feuilles étroites <i>Salix repens</i> ; Samole de Valerand <i>Samolus valerandi</i> ; Séneçon de Fuchs <i>Senecio fuchsii</i> ; Germandrée des marais <i>Teucrium scordium</i> ; Utriculaire vulgaire <i>Utricularia vulgaris</i></p> <p><u>Poissons</u> : Chabot <i>Cottus gobio</i> ; Brochet <i>Esox lucius</i> ; Lamproie de Planer <i>Lampetra planeri</i> ; Lote <i>Lota lota</i></p> <p><u>Ptéridophytes</u> : Ophioglosse commun <i>Ophioglossum vulgatum</i></p>
<p><b>Les Grands Marais et les Ronds Trous à Prouilly et Trigny</b></p>	<p>Muizon ; Trigny ; Prouilly ; Courcelles-Sapicourt</p>	<p>La ZNIEFF des Grands Marais et des Ronds Trous est située en aval de Muizon, au sud de Prouilly et de Trigny, dans le département de la Marne. Elle fait partie de la grande ZNIEFF de type II de la vallée de la Vesle. Le marais possède des groupements végétaux variés correspondant à différents faciès et stades dynamiques de la tourbière alcaline. La ZNIEFF est dans un bon état général de conservation</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Communautés à grandes Laïches ; Roselières ; Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) ; Communautés amphibies ; Végétation à <i>Cladium mariscus</i></p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Odonates</u> : Aesche isocèle <i>Anaciaeschna isosceles</i> ; L'Aesche printanière <i>Brachytron pratense</i> ; Le Gomphe vulgaire <i>Gomphus vulgatissimus</i> ; La Leucorrhine à gros thorax <i>Leucorrhinia pectoralis</i> ; La Libellule fauve <i>Libellula fulva</i> ; La Cordulie métallique <i>Somatochlora metallica</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Mouron délicat <i>Anagallis tenella</i> ; <i>Carex serotina</i> ; Oenanthe de Lachenal <i>Oenanthe lachenalii</i> ; Potamot</p>

			des tourbières alcalines <i>Potamogeton coloratus</i> ; Samole de Valerand <i>Samolus valerandi</i> ; Utriculaire vulgaire <i>Utricularia vulgaris</i>
<b>Marais de la Vesle de Muizon au chemin de Maco</b>	Muizon ; Thillois ; Champigny ; Trigny ; Châlons-sur-Vesle ; Merfy	La ZNIEFF des marais de la Vesle depuis le village de Muizon jusqu'à la route de Maco est située au nord-est de la commune. Elle fait partie de la grande ZNIEFF de type II de la vallée de la Vesle. Elle est constituée par des groupements végétaux variés correspondant à différents faciès et stades dynamiques de la tourbière alcaline. La ZNIEFF est encore en assez bon état, elle subit malheureusement de nombreuses dégradations (plantations de peupliers, assèchement du milieu et dynamique préforestière, pollution de la Vesle, mitage du site par les résidences secondaires et les étangs associés, eutrophisation).	<p><b>Habitats</b></p> <p>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) ; Végétation à <i>Cladium mariscus</i> ; Communautés à grandes Laïches ; Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères ; Roselières</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Phanérogames</u> : Laïche paradoxale <i>Carex appropinquata</i> ; Laïche à fruit barbu <i>Carex lasiocarpa</i> ; Laïche de Maire <i>Carex mairei</i> ; Orchis incarnat <i>Dactylorhiza incarnata</i> ; Gesse des marais <i>Lathyrus palustris</i> ; Oenanthe de Lachenal <i>Oenanthe lachenalii</i> ; Orchis oublié <i>Orchis praetermissa</i> ; Grande douve <i>Ranunculus lingua</i> ; Saule à feuilles étroites <i>Salix repens</i> ; Samole de Valerand <i>Samolus valerandi</i> ; Laiteron des marais <i>Sonchus palustris</i> ; Utriculaire vulgaire <i>Utricularia vulgaris</i></p> <p><u>Reptiles</u> : Vipère péliade <i>Vipera berus</i></p>
<b>Tourbières alcalines des Trous de Leu à l'ouest de Saint-Léonard</b>	Cormontreuil ; Saint-Léonard ; Reims ; Taissy	La ZNIEFF de la tourbière alcaline des Trous de Leu est située à l'ouest de Taissy et de Saint-Léonard, à quelques kilomètres en amont de la ville de Reims. Elle fait partie de la grande ZNIEFF II de la vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon et constitue une ZNIEFF I de près de 130 hectares regroupant les milieux alluviaux les plus typiques de la vallée (différents stades de la tourbière alcaline), les boisements et les quelques prairies et cultures présents sur le site. C'est de plus une zone paysagère qui joue un rôle fondamental dans l'équilibre de la vallée. La ZNIEFF a été proposée, avec la celle du Val de Vesle dans le cadre de la directive Habitats (site n° 39 : marais de la Vesle en amont de Reims). Elle figure parmi les tourbières les plus importantes du département et regroupe les milieux les mieux conservés de la vallée. Diverses menaces pèsent sur elle, comme par exemple la dynamique naturelle (abandon du pâturage), le grignotage du	<p><b>Habitats</b></p> <p>Prairies à Molinie et communautés associées ; Roselières ; Végétation à <i>Cladium mariscus</i> ; Communautés à grandes Laïches</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Amphibiens</u> : Rainette verte <i>Hyla arborea</i></p> <p><u>Mammifères</u> : Putois d'Europe, Furet <i>Mustela putorius</i> ; Murin de Daubenton <i>Myotis daubentoni</i> ; Murin à moustaches <i>Myotis mystacinus</i> ; Murin de Natterer <i>Myotis nattereri</i> ; Crossope aquatique <i>Neomys fodiens</i> ; Oreillard roux <i>Plecotus auritus</i></p> <p><u>Odonates</u> : Le Cordulégastré annelé <i>Cordulegaster boltoni</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Laïche paradoxale <i>Carex appropinquata</i> ; Laïche à fruit barbu <i>Carex lasiocarpa</i> ; Orchis incarnat <i>Dactylorhiza incarnata</i> ; Épipactis des marais <i>Epipactis palustris</i> ; Oenanthe de Lachenal <i>Oenanthe lachenalii</i> ; Peucedan des marais <i>Peucedanum palustre</i> ; Grande douve <i>Ranunculus lingua</i> ; Cassis <i>Ribes nigrum</i> ; Saule à feuilles étroites <i>Salix repens</i> ;</p>

		marais par la culture (maraîchage en particulier) et par la plantation de peupliers, l'assèchement progressif de la nappe de la vallée, etc.	Laiteron des marais <i>Sonchus palustris</i> ; Utriculaire vulgaire <i>Utricularia vulgaris</i>
<b>Le Marais de Vendière à Courlandon et les Mares et Marais de Romain</b>	Courlandon ; Breuil ; Romain ; Magneux	La ZNIEFF regroupe le marais de Vendière à Courlandon, à l'ouest de la zone et les mares et marais de Romain vers Breuil à l'est de la zone. Elle fait partie de la grande ZNIEFF de type II de la vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon. Elle regroupe les différents stades de la tourbière alcaline, les boisements et quelques étangs présents sur le site. Comme toutes les tourbières de la vallée de la Vesle, celle-ci, en bon état, est menacée par les activités humaines (extraction de la tourbe, plantations de peupliers) et par la dynamique forestière naturelle.	<p><b>Habitats</b></p> <p>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) ; Communautés à grandes Laïches ; Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais ; Prairies à Molinie et communautés associées</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Mammifères</u> : Crossope aquatique <i>Neomys fodiens</i></p> <p><u>Oiseaux</u> : Phragmite des joncs <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> ; Gorgebleue à miroir <i>Luscinia svecica</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Mouron délicat <i>Anagallis tenella</i> ; Laïche à épis distants <i>Carex distans</i> ; <i>Carex serotina</i> ; Orchis négligé <i>Dactylorhiza praetermissa</i> ; Cassis <i>Ribes nigrum</i> ; Samole de Valerand <i>Samolus valerandi</i> ; Laiteron des marais <i>Sonchus palustris</i></p> <p><u>Ptéridophytes</u> : Fougère des marais <i>Thelypteris palustris</i></p>
<b>Marais du Mont de Berru à Berru et Cernay</b>	Berru ; Cernay-lès-Reims	La ZNIEFF dite des marais du Mont de Berru est située entre les villages de Berru et de Cernay à une dizaine de kilomètres à l'est de Reims. La ZNIEFF est éclatée en trois zones proches (Mont Plein, Rosière, les Pauvretés et les Cossis) qui regroupent une série de tourbières alcalines parsemées d'une multitude de petites mares de forme, de diamètre et de profondeur très variables. Une partie des bois qui les abritent est également incluse dans le périmètre de cette zone qui fait partie de la grande ZNIEFF de type II du Mont de Berru. La ZNIEFF est en bon état, mais est fortement menacée par de nombreux facteurs : piétinement du sol par les nombreux promeneurs, pratique de la moto verte, menace sur la faune (prélèvements extrêmement importants de tritons et de grenouilles par les enfants, destruction systématique des terriers de blaireau par les	<p><b>Habitats</b></p> <p>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) ; Prairies à Molinie et communautés associées ; Communautés amphibies ; Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Amphibiens</u> : Salamandre tachetée <i>Salamandra salamandra</i> ; Triton crêté <i>Triturus cristatus</i></p> <p><u>Autres insectes</u> : Mante religieuse <i>Mantis religiosa</i></p> <p><u>Lépidoptères</u> : Le Machaon <i>Papilio machaon</i></p> <p><u>Odonates</u> : Le Cordulégastre annelé <i>Cordulegaster boltoni</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Laïche puce <i>Carex pulicaris</i> ; Orchis négligé <i>Dactylorhiza praetermissa</i> ; Scirpe pauciflore <i>Eleocharis quinqueflora</i> ; Gymnadenie odorante <i>Gymnadenia odoratissima</i> ; Oenanthe de Lachenal <i>Oenanthe lachenalii</i> ; Grasette</p>

		chasseurs), dynamique naturelle (comblement des mares et envahissement des clairières par la forêt riveraine) et plantations de résineux.	commune <i>Pinguicula vulgaris</i> ; Potamot des tourbières alcalines <i>Potamogeton coloratus</i>  <u>Ptérédophytes</u> : Ophioglosse commun <i>Ophioglossum vulgatum</i>  <u>Reptiles</u> : Lézard des souches <i>Lacerta agilis</i> ; Lézard à deux raies <i>Lacerta viridis</i>
<b>Marais boisé de Vaudétré à Warmeriville</b>	Heutrégiville ; Warmeriville	la ZNIEFF du marais boisé de Vaudétré occupe une surface de près de 90 hectares dans la vallée tourbeuse de la Suipe entre les communes de Warméville et d'Heutrégiville, dans le département de la Marne. C'est un ensemble assez boisé avec une frênaie alluviale sur les terrasses crayeuses (graveluches), une aulnaie tourbeuse dans l'axe de la vallée, quelques peupleraies anciennes, des zones ouvertes à cariçaies et roselières. La zone est en bon état, elle est menacée par la rectification du cours de la rivière en amont, les plantations de peupliers et le creusement éventuel de nouveaux étangs.	<b>Habitats</b>  Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais ; Roselières ; Communautés à grandes Laïches ; Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens  <b>Espèces</b>  <u>Mammifères</u> : Putois d'Europe, Furet <i>Mustela putorius</i>  <u>Odonates</u> : Le Cordulégastre annelé <i>Cordulegaster boltoni</i>  <u>Phanérogames</u> : Laïche paradoxale <i>Carex appropinquata</i> ; Pâturin des marais <i>Poa palustris</i>
<b>Marais du Vivier à Chenay et Trigny</b>	Trigny ; Chenay	La ZNIEFF dite du marais du Vivier est située sur les territoires communaux de Trigny et de Chenay, au nord-ouest de Reims. Elle regroupe une des six tourbières alcalines sur tourbe de la région naturelle du Tadernois, des étangs ainsi que des groupements forestiers troués de petites pelouses sur les zones sablonneuses environnantes plus sèches. C'est un des sites majeurs de la Marne. Il est en bon état, mais menacé d'une part par l'évolution dynamique de la végétation et d'autre part par l'action de l'homme (création d'étangs, fossés de drainage, etc.)	<b>Habitats</b>  Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) ; Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes ; Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles ; Végétations aquatiques ; Végétation à <i>Cladium mariscus</i>  <b>Espèces</b>  <u>Lépidoptères</u> : L'Azuré de la Croisette <i>Maculinea alcon alcon</i>  <u>Odonates</u> : Le Cordulégastre annelé <i>Cordulegaster boltoni</i>  <u>Phanérogames</u> : Canche caryophyllée <i>Aira caryophyllea</i> ; Canche printanière <i>Aira praecox</i> ; Mouron délicat <i>Anagallis tenella</i> ; Laïche des sables <i>Carex arenaria</i> ; Laïche des bruyères <i>Carex ericetorum</i> ; Laïche puce <i>Carex pulicaris</i> ; Conopode dénudé <i>Conopodium majus</i> ; Corynéphore blanchâtre <i>Corynephorus canescens</i> ; Orchis négligé <i>Dactylorhiza praetermissa</i> ; Rossolis à feuilles longues <i>Drosera anglica</i> ; Élatine à six étamines <i>Elatine hexandra</i> ; Linaigrette à feuilles larges <i>Eriophorum latifolium</i> ; Géranium sanguin <i>Geranium sanguineum</i> ; Gymnadenie odorante <i>Gymnadenia odoratissima</i> ; Jasione des

			<p>montagnes <i>Jasione montana</i> ; Liparis de Loesel <i>Liparis loeselii</i> ; Trèfle d'eau <i>Menyanthes trifoliata</i> ; Mibora naine <i>Mibora minima</i> ; Oenanthe de Lachenal <i>Oenanthe lachenalii</i> ; Parnassie des marais <i>Parnassia palustris</i> ; Peucedan des marais <i>Peucedanum palustre</i> ; Grassette commune <i>Pinguicula vulgaris</i> ; Potamot des tourbières alcalines <i>Potamogeton coloratus</i> ; Saule rampant <i>Salix repens</i> subsp. <i>repens</i> ; Troscart des marais <i>Triglochin palustris</i> ; Utriculaire vulgaire <i>Utricularia vulgaris</i></p> <p><u>Ptéridophytes</u> : Botryche lunaire <i>Botrychium lunaria</i> ; Prêle d'hiver <i>Equisetum hyemale</i> ; Ophioglosse commun <i>Ophioglossum vulgatum</i></p>
<p><b>Le Grand Marais de Cormicy</b></p>	<p>Cauroy-lès-Hermonville ; Cormicy</p>	<p>La ZNIEFF du Grand Marais est située en bordure du massif forestier de Cormicy, au sud du village. Elle est constituée par l'une des dernières tourbières alcalines de la région du Tadernois (nord-ouest de Reims) et par ses groupements périphériques. Le marais possède une très grande variété de groupements végétaux correspondant à différents faciès et stades dynamiques de la tourbière. La ZNIEFF du Grand Marais de Cormicy un des sites importants du département de la Marne. Elle est en bon état, mais menacée par l'évolution dynamique de la végétation et les plantations de peupliers : il y a quelques années près de la moitié du marais a été plantée en peupliers, néanmoins une zone centrale a pu être rénovée (enlèvement des peupliers plantés). Heureusement le développement des peupliers est très lent et le marais actuellement est peu altéré (mais enlèvement à prévoir assez rapidement).</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) ; Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais ; Prairies à Molinie et communautés associées ; Végétation à <i>Cladium mariscus</i></p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Amphibiens</u> : Salamandre tachetée <i>Salamandra salamandra</i></p> <p><u>Lépidoptères</u> : Le Petit Agreste <i>Arethusana arethusana</i> ; Le Fadet de la Mélique <i>Coenonympha glycerion</i> ; L'Azuré de la Croisette <i>Maculinea alcon alcon</i></p> <p><u>Odonates</u> : La Grande Aesche <i>Aeshna grandis</i> ; Aesche isocèle <i>Anaciaeschna isosceles</i> ; L'Aesche printanière <i>Brachytron pratense</i> ; Agrion délicat <i>Ceriagrion tenellum</i> ; Agrion de Mercure <i>Coenagrion mercuriale</i> ; Agrion joli <i>Coenagrion pulchellum</i> ; Le Cordulégastre annelé <i>Cordulegaster boltoni</i> ; Le Crocothémis écarlate <i>Crocothemis erythraea</i> ; La Libellule fauve <i>Libellula fulva</i> ; L'Orthétrum brun <i>Orthetrum brunneum</i> ; La Cordulie à taches jaunes <i>Somatochlora flavomaculata</i></p> <p><u>Oiseaux</u> : Phragmite des joncs <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> ; Pipit farlouse <i>Anthus pratensis</i> ; Traquet tarier <i>Saxicola rubetra</i></p> <p><u>Orthoptères</u> : Criquet palustre <i>Chorthippus montanus</i> ; Conocéphale des Roseaux <i>Conocephalus dorsalis</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Mouron délicat <i>Anagallis tenella</i> ; Orchis incarnat <i>Dactylorhiza</i></p>

			<p><i>incarnata</i> ; Orchis négligé <i>Dactylorhiza praetermissa</i> ; Linaigrette à feuilles larges <i>Eriophorum latifolium</i> ; Liparis de Loesel <i>Liparis loeselii</i> ; Trèfle d'eau <i>Menyanthes trifoliata</i> ; Oenanthe de Lachenal <i>Oenanthe lachenalii</i> ; Orchis des marais <i>Orchis palustris</i> ; Parnassie des marais <i>Parnassia palustris</i> ; Grassette commune <i>Pinguicula vulgaris</i> ; Potamot des tourbières alcalines <i>Potamogeton coloratus</i> ; Cerisier à grappes <i>Prunus padus</i> ; Saule à feuilles étroites <i>Salix repens</i> ; Laiteron des marais <i>Sonchus palustris</i></p> <p><u>Ptéridophytes</u> : Ophioglosse commun <i>Ophioglossum vulgatum</i> ; Fougère des marais <i>Thelypteris palustris</i></p>
<b>Bois et mares de Rilly-la-Montagne</b>	Rilly-la-Montagne	<p>La ZNIEFF des bois et des mares de Rilly-la-Montagne couvre une cinquantaine d'hectares sur le plateau et le haut des versants surplombant le village. La végétation de la ZNIEFF est variée et regroupe différents types de forêts, leurs lisières et une végétation originale liée à la présence d'une petite dizaine de mares sur le plateau (anciennes excavations de pierres à meulière). Le site fait partie du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. Le site est dans un bon état général de conservation.</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Végétations aquatiques ; Communautés amphibies ; Landes sèches ; Forêts de Pins sylvestres ; Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Amphibiens</u> : Rainette verte <i>Hyla arborea</i> ; Triton crêté <i>Triturus cristatus</i></p> <p><u>Odonates</u> : L'Aeschne printanière <i>Brachytron pratense</i> ; L'Agrion à fer de lance <i>Coenagrion hastulatum</i> ; L'Agrion nain <i>Ischnura pumilio</i> ; Leste des bois <i>Lestes dryas</i> ; La Cordulie métallique <i>Somatochlora metallica</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Flûteau fausse-renoncule <i>Baldellia ranunculoides</i> ; Laïche étoilée <i>Carex echinata</i> ; Laïche des montagnes <i>Carex montana</i> ; Jonc des vasières <i>Juncus tenageia</i> ; Petite pyrole <i>Pyrola minor</i> ; Rubanier nain <i>Sparganium minimum</i> ; Petite utriculaire <i>Utricularia minor</i></p>
<b>Marais boisé des Grands Usages à Pontfaverger</b>	Pontfaverger-Moronvilliers	<p>La ZNIEFF des Grands Usages occupe une surface de 36 hectares au niveau de la vallée tourbeuse de la Suipe, à l'est de Pontfaverger-Moronvilliers. Elle est constituée par des boisements riverains (aulnaie-frênaie, aulnaie, frênaie et saulaie blanche en bordure de rivière), une zone plus ouverte sous la ligne électrique occupée par les roselières et cariages, des peupleraies, un petit étang et des groupements aquatiques. La ZNIEFF est dans un état de conservation assez précaire : l'intérêt est surtout lié à la</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Roselières ; Bordures à Calamagrostis des eaux courantes ; Zone à Truites ; Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens ; Communautés à grandes Laïches</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Mammifères</u> : Putois d'Europe, Furet <i>Mustela putorius</i> ; Crossope aquatique <i>Neomys fodiens</i></p> <p><u>Odonates</u> : Le Cordulégastre annelé <i>Cordulegaster boltoni</i></p>

		présence de la rivière et de la diversité faunistique qu'elle engendre, l'intérêt floristique lié à la zone marécageuse est fortement réduit (eutrophisation importante).	<u>Phanérogames</u> : Laïche paradoxale <i>Carex appropinquata</i> ; Grande douve <i>Ranunculus lingua</i> ; Cassis <i>Ribes nigrum</i> ; Stellaire des marais <i>Stellaria palustris</i>
<b>Etang de Montreuil à Sermiers</b>	Sermiers	La ZNIEFF dite de l'Etang de Montreuil se situe dans la Forêt Domaniale de Sermiers au fond d'un vallon orienté au nord où la rivière de l'Ardres prend sa source. Elle est constituée de deux petits étangs contigus et des bois qui les bordent. L'étang situé en aval est en eau et celui situé en amont est la plupart du temps exondé avec une végétation marécageuse développée. Situés dans un contexte argilo-sableux, ils possèdent des eaux mésotrophes et une grande diversité de groupements végétaux. Cette ZNIEFF fait partie de la grande ZNIEFF de type II de la vallée de l'Ardre et de ses affluents entre Saint-Imoges et Fismes et elle est incluse dans Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. Elle est dans un bon état général de conservation.	<p><b>Habitats</b></p> <p>Végétations aquatiques ; Gazons amphibies annuels septentrionaux ; Communautés à grandes Laïches</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Oiseaux</u> : Phragmite des joncs <i>Acrocephalus schoenobaenus</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Scirpe à inflorescence ovoïde <i>Eleocharis ovata</i> ; Petite Renouée <i>Polygonum minus</i> ; Potamot à tige comprimée <i>Potamogeton compressus</i></p>
<b>Marais de Tranlais à Prouilly</b>	Prouilly	Le Marais de Tranlais à Prouilly est l'un des rares marais alcalins subsistant dans le Tadernois. Situé au pied d'un vallon très peu marqué situé au sud du village, il est lié à l'émergence de la nappe phréatique des sables de Châlons-sur-Vesle au contact des marnes imperméables du Thanétien. Le marais possède une très grande variété de groupements végétaux. C'est un des sites majeurs de la Marne. Il est en bon état, mais une partie du site est perturbée par les incendies qui y ont eu lieu entraînant une diminution de la représentation des espèces végétales caractéristiques du marais et perturbant les populations des fourmis-hôtes de l'azuré des mouillères. Une décharge importante est située en partie nord du marais, celle-ci est à l'origine des nombreux incendies du marais.	<p><b>Habitats</b></p> <p>Prairies à Molinie et communautés associées ; Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) ; Végétation à <i>Cladium mariscus</i> ; Roselières</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Lépidoptères</u> : L'Azuré de la Croisette <i>Maculinea alcon alcon</i></p> <p><u>Odonates</u> : Le Cordulégastre annelé <i>Cordulegaster boltoni</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Mouron délicat <i>Anagallis tenella</i> ; Oenanthe de Lachenal <i>Oenanthe lachenalii</i> ; Parnassie des marais <i>Parnassia palustris</i> ; Grassette commune <i>Pinguicula vulgaris</i> ; Samole de Valerand <i>Samolus valerandi</i></p> <p><u>Ptéridophytes</u> : Ophioglosse commun <i>Ophioglossum vulgatum</i></p>
<b>Marais de Pévy (près de la ferme Havelon)</b>	Pévy	La ZNIEFF dite du marais de Pévy est située à proximité de la Ferme Havelon, sur le territoire de la commune de Pévy, au nord-ouest de Reims. Elle regroupe	<p><b>Habitats</b></p> <p>Végétation à <i>Cladium mariscus</i> ; Prairies à Molinie et communautés associées Bas-</p>

		<p>une des cinq tourbières alcalines de la région naturelle du Tadernois (Soissonais de la Marne). C'est un petit marais de pente faible orientée nord, d'environ 6 hectares, alimenté par une ligne de sources et un petit ruisseau. C'est un des sites importants du département de la Marne. Il est très dégradé par les plantations de peupliers et menacé d'une part par l'évolution dynamique de la végétation et d'autre part par l'action de l'homme (environnement viticole important en amont des sources d'alimentation du marais, rectification du fossé en partie basse du marais, drainage, etc.) avec une dégradation très récente du marais.</p>	<p>marais alcalins (tourbières basses alcalines)</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Amphibiens</u> : Salamandre tachetée <i>Salamandra salamandra</i></p> <p><u>Lépidoptères</u> : L'Azuré de la Croisette <i>Maculinea alcon alcon</i></p> <p><u>Odonates</u> : Le Cordulégastre annelé <i>Cordulegaster boltoni</i> ; La Libellule fauve <i>Libellula fulva</i></p> <p><u>Orthoptères</u> : Criquet ensanglanté <i>Mecostethus grossus</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Mouron délicat <i>Anagallis tenella</i> ; Orchis négligé <i>Dactylorhiza praetermissa</i> ; Oenanthe de Lachenal <i>Oenanthe lachenalii</i> ; Parnassie des marais <i>Parnassia palustris</i> ; Grassette commune <i>Pinguicula vulgaris</i> ; Samole de Valerand <i>Samolus valerandi</i></p> <p><u>Ptéridophytes</u> : Ophioglosse commun <i>Ophioglossum vulgatum</i></p>
<p><b>Marais de Neuf Ans à Prouilly</b></p>	<p>Prouilly</p>	<p>Le Marais de Neuf Ans à Prouilly est l'un des rares marais alcalins subsistant en Tadernois (Soissonois de la Marne). Situé au pied d'un vallon très peu marqué situé au sud-est du village, il est lié à l'émergence de la nappe phréatique des sables de Châlonssur-Vesle au contact des marnes imperméables du Thanétien. Le marais possède une très grande variété de groupements végétaux correspondant à différents faciès et stades dynamiques de la tourbière alcaline. La ZNIEFF du Marais de Neuf Ans est un des sites importants du département de la Marne. Elle est en bon état, mais menacée par l'évolution dynamique (boisement de la partie est du marais non soumise au pâturage), l'épendage de produits phytosanitaires liés aux cultures proches, l'éventuelle intensification du pâturage et, éventuellement, le feu et la forte accessibilité du marais (attire pour les collectionneurs).</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Prairies à Molinie et communautés associées ; Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) ; Végétation à <i>Cladium mariscus</i></p> <p><b>Espèces</b></p> <p>Amphibiens : Salamandre tachetée <i>Salamandra salamandra</i></p> <p>Lépidoptères : L'Azuré de la Croisette <i>Maculinea alcon alcon</i></p> <p>Odonates : Le Cordulégastre annelé <i>Cordulegaster boltoni</i> ; L'Orthétrum brun <i>Orthetrum brunneum</i></p> <p>Oiseaux : Pipit farlouse <i>Anthus pratensis</i> ; Rougequeue à front blanc <i>Phoenicurus phoenicurus</i></p> <p>Orthoptères : Criquet des Génévriers <i>Chrysochraon brachyptera</i> ; Conocéphale des Roseaux <i>Conocephalus dorsalis</i> ; Criquet ensanglanté <i>Mecostethus grossus</i> ; Mouron délicat <i>Anagallis tenella</i> ; Laïche à épis distants <i>Carex distans</i> ; Orchis incarnat <i>Dactylorhiza incarnata</i> ; Orchis négligé <i>Dactylorhiza praetermissa</i> ; Scirpe pauciflore <i>Eleocharis quinqueflora</i> ; Gentiane des marais <i>Gentiana pneumonanthe</i> ; Gymnadenie odorante</p>

			<p><i>Gymnadenia odoratissima</i> ; Oenanthe de Lachenal <i>Oenanthe lachenalii</i> ; Orchis des marais <i>Orchis palustris</i> ; Parnassie des marais <i>Parnassia palustris</i> ; Grassette commune <i>Pinguicula vulgaris</i> ; Samole de Valerand <i>Samolus valerandi</i></p>
<b>ZNIEFF de type II</b>			
<b>Massif Forestier de Cormicy</b>	Bouvancourt, Cauroy-lès-Hermonville, Guyencourt, Cormicy, Bouffignereux	<p>Le massif forestier de Cormicy constitue une vaste ZNIEFF de type II de plus de 1100 ha située sur les départements de la Marne et de l'Aisne. Elle couvre un versant de la Côte du Soissonais et plusieurs buttes-témoins qui s'en sont détachées. Sa végétation est variée : si les forêts dominent largement, on rencontre aussi des marais alcalins et leurs milieux associés (le Grand Marais, marais de la Culée, du Béreau, etc.), des pelouses calcaires, des pelouses acides sur sables et des fragments de landes relictuelles. Des plantations de pins noirs et pins sylvestres sont disséminées çà et là. Une grande carrière de sable en activité est située au nord de Cauroy-lès-Hermonville. La ZNIEFF du massif forestier de Cormicy, aux remarquables qualités paysagères et biologiques, fréquenté par de nombreux promeneurs, est un des sites importants du département de la Marne. Elle est en bon état, mais menacée par les plantations (pins et peupliers) et par la dynamique naturelle de la végétation (fermeture des pelouses et des marais).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Habitats</b></p> <p>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides ; Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens ; Chenaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques ; Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) ; Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</p> <p style="text-align: center;"><b>Espèces</b></p> <p><u>Amphibiens</u> : Salamandre tachetée <i>Salamandra salamandra</i></p> <p><u>Lépidoptères</u> : Le Petit Agreste <i>Arethusana arethusa</i> ; Le Fadet de la Mélique <i>Coenonympha glycerion</i> ; L'Azuré de la Croisette <i>Maculinea alcon alcon</i> ; La Mélitée noirâtre <i>Melitaea diamina</i></p> <p><u>Mammifères</u> : Le Putois d'Europe, Furet <i>Mustela putorius</i> ; Le Murin à oreilles échanquées <i>Myotis emarginatus</i> ; Murin à moustaches <i>Myotis mystacinus</i> ; Murin de Natterer <i>Myotis nattereri</i> ; Oreillard gris <i>Plecotus austriacus</i> ; Grand rhinolophe <i>Rhinolophus ferrumequinum</i></p> <p><u>Odonates</u> : La Grande Aesche <i>Aeshna grandis</i> ; Aesche isocèle <i>Anaciaeschna isosceles</i> ; L'Aesche printanière <i>Brachytron pratense</i> ; Agrion délicat <i>Ceriagrion tenellum</i> ; Agrion de Mercure <i>Coenagrion mercuriale</i> ; Agrion joli <i>Coenagrion pulchellum</i> ; Le Cordulégastre annelé <i>Cordulegaster boltoni</i> ; Le Crocothémis écarlate <i>Crocothemis erythraea</i> ; La Libellule fauve <i>Libellula fulva</i> ; L'Orthétrum brun <i>Orthetrum brunneum</i> ; La Cordulie à taches jaunes <i>Somatochlora flavomaculata</i></p> <p><u>Oiseaux</u> : Phragmite des joncs <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> ; Traquet tarier <i>Saxicola rubetra</i></p> <p><u>Orthoptères</u> : Le Criquet palustre <i>Chorthippus montanus</i> ; Conocéphale des Roseaux <i>Conocephalus dorsalis</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Mouron délicat <i>Anagallis tenella</i> ; Marguerite de la Saint-Michel <i>Aster amellus</i> ; Laïche à épis distants <i>Carex distans</i> ; Laïche humble <i>Carex humilis</i> ; Laïche pied d'oiseau <i>Carex ornithopoda</i> ;</p>

			<p>Corynéphore blanchâtre <i>Corynephorus canescens</i>; Orchis incarnat <i>Dactylorhiza incarnata</i>; Orchis négligé <i>Dactylorhiza praetermissa</i>; Linaigrette à feuilles larges <i>Eriophorum latifolium</i>; Cotonnière naine <i>Filago minima</i>; Liparis de Loesel <i>Liparis loeselii</i>; Luzule de Forster <i>Luzula forsteri</i>; Trèfle d'eau <i>Menyanthes trifoliata</i>; Mibora naine <i>Mibora minima</i>; Oenanthe de Lachenal <i>Oenanthe lachenalii</i>; Ophrys abeille <i>Ophrys sphegodes</i>; Orchis des marais <i>Orchis palustris</i>; Ornithope délicat <i>Ornithopus perpusillus</i>; Parnassie des marais <i>Parnassia palustris</i>; Grassette commune <i>Pinguicula vulgaris</i>; Potamot des tourbières alcalines <i>Potamogeton coloratus</i>; Saule rampant <i>Salix repens</i>; Laiteron des marais <i>Sonchus palustris</i></p> <p><u>Ptéridophytes</u>: Prêle d'hiver <i>Equisetum hyemale</i>; Ophioglosse commun <i>Ophioglossum vulgatum</i>; Fougère des marais <i>Thelypteris palustris</i></p> <p><u>Reptiles</u>: Lézard des souches <i>Lacerta agilis</i></p>
<p><b>Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon</b></p>	<p>Saint-Thierry, Muizon, Thillois, Champigny, Jonchery-sur-Vesle, Beaumont-sur-Vesle, Sillery, Trigny, Courlandon, Verzenay, Cormontreuil, Montigny-sur-Vesle, Breuil, Saint-Brice-Courcelles, Châlons-sur-Vesle, Prouilly, Courcelles-Sapicourt, Sept-Saulx, Puisieulx, Vandeuil, Merfy, Saint-Léonard, Romain, Reims, Val-de-Vesle, Magneux, Taissy, Prunay</p>	<p>L'ensemble des boisements, marais et milieux associés de la Vallée de la Vesle constitue une ZNIEFF de type II nommée "Vallée de la Vesle de Livry-Couvercy à Courlandon". Elle couvre 2 682 hectares en aval et en amont de Reims et concerne 26 communes de la vallée. Elle est caractéristique de la Champagne crayeuse, avec une zone marécageuse encore en assez bon état, bien que de plus en plus dégradée. On y rencontre tous les stades dynamiques de la tourbière alcaline</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Roselières ; Lits des rivières ; Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères ; Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) ; Communautés à grandes Laïches</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Amphibiens</u>: Alyte accoucheur <i>Alytes obstetricans</i>; Rainette verte <i>Hyla arborea</i>; Triton crêté <i>Triturus cristatus</i></p> <p><u>Lépidoptères</u>: L'Azuré de la Croisette <i>Maculinea alcon alcon</i></p> <p><u>Mammifères</u>: Le Putois d'Europe, Furet <i>Mustela putorius</i>; Murin de Daubenton <i>Myotis daubentoni</i>; Murin à moustaches <i>Myotis mystacinus</i>; Murin de Natterer <i>Myotis nattereri</i>; Crossope aquatique <i>Neomys fodiens</i>; Oreillard roux <i>Plecotus auritus</i></p> <p><u>Odonates</u>: Aeschne isocèle <i>Anaciaeschna isosceles</i>; Aeschne printanière <i>Brachytron pratense</i>; Le Cordulégastré annelé <i>Cordulegaster boltoni</i>; Le Gomphe vulgaire <i>Gomphus vulgatissimus</i>; La Leucorrhine à gros thorax <i>Leucorrhinia pectoralis</i>; La Libellule fauve <i>Libellula fulva</i>; La Cordulie métallique <i>Somatochlora metallica</i>.</p> <p><u>Oiseaux</u>: Rousserolle turdoïde <i>Acrocephalus arundinaceus</i>; Phragmite des joncs <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>;</p>

			<p>Pipit farlouse <i>Anthus pratensis</i> ; Bouscarle de Cetti <i>Cettia cetti</i> ; Cincle plongeur <i>Cinclus cinclus</i> ; Busard des roseaux <i>Circus aeruginosus</i> ; Pigeon colombin <i>Columba oenas</i> ; Faucon hobereau <i>Falco subbuteo</i> ; Cochevis huppé <i>Galerida cristata</i> ; Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio</i> ; Pie-grièche grise <i>Lanius excubitor</i> ; Locustelle luscinioïde <i>Locustella luscinioides</i> ; Gorgebleue à miroir <i>Luscinia svecica</i> ; Traquet motteux <i>Oenanthe oenanthe</i> ; Rougequeue à front blanc <i>Phoenicurus phoenicurus</i> ; Hirondelle de rivage <i>Riparia riparia</i> ; Traquet tarier <i>Saxicola rubetra</i> ; Vanneau huppé <i>Vanellus vanellus</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Mouron délicat <i>Anagallis tenella</i> ; Flûteau fausse-renoncule <i>Baldellia ranunculoides</i> ; Laïche paradoxale <i>Carex appropinquata</i> ; Laïche à épis distants <i>Carex distans</i> ; Laïche à fruit barbu <i>Carex lasiocarpa</i> ; Laïche de Maire <i>Carex mairei</i> ; <i>Carex serotina</i> ; Orchis incarnat <i>Dactylorhiza incarnata</i> ; Orchis négligé <i>Dactylorhiza praetermissa</i> ; Gesse des marais <i>Lathyrus palustris</i> ; Oenanthe de Lachenal <i>Oenanthe lachenalii</i> ; Orchis des marais <i>Orchis palustris</i> ; Parnassie des marais <i>Parnassia palustris</i> ; Peucedan des marais <i>Peucedanum palustre</i> ; Grassette commune <i>Pinguicula vulgaris</i> ; Potamot des tourbières alcalines <i>Potamogeton coloratus</i> ; Grande douve <i>Ranunculus lingua</i> ; Cassis <i>Ribes nigrum</i> ; Saule à cinq étamines <i>Salix pentandra</i> ; Saule rampant <i>Salix repens</i> ; Mouron d'eau <i>Samolus valerandi</i> ; Sénéçon de Fuchs <i>Senecio fuchsii</i> ; Laiteron des marais <i>Sonchus palustris</i> ; Rubanier nain <i>Sparganium minimum</i> ; Stellaire des marais <i>Stellaria palustris</i> ; Germandrée des marais <i>Teucrium scordium</i> ; Troscart des marais <i>Triglochin palustris</i> ; Orme lisse <i>Ulmus laevis</i> ; Utriculaire vulgaire <i>Utricularia vulgaris</i></p> <p><u>Poissons</u> : Chabot <i>Cottus gobio</i> ; Brochet <i>Esox lucius</i> ; Lamproie de Planer <i>Lampetra planeri</i> ; Lote <i>Lota lota</i></p> <p><u>Ptéridophytes</u> : Ophioglosse commun <i>Ophioglossum vulgatum</i> ; Fougère des marais <i>Thelypteris palustris</i></p>
<p><b>Vallée de l'Ardre et de ses affluents entre Saint-Imoges et Fismes</b></p>	<p>Ville-en-Tardenois ; Saint-Euphraise-et-Clairizet ; Courtagnon ; Bouleuse ; Saint-Gilles ; Tramery ; Germigny ; Pourcy ; Écueil ; Bligny ; Chambrecy ; Sermiers ; Pargny-lès-</p>	<p>La ZNIEFF de la vallée de l'Ardre et de ses affluents, d'une superficie de plus de 5 000 hectares, est située entre Saint-Imoges et Fismes, dans le département de la Marne. Elle constitue un ensemble complexe de bois humides, prairies, cultures et aussi groupements de hautes herbes dans la vallée et</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Prairies humides eutrophes ; Lits des rivières ; Roselières ; Prairies de fauche de basse altitude ; Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Amphibiens</u> : Alyte accoucheur <i>Alytes</i></p>

	<p>Reims ; Jouy-lès-Reims ; Fismes ; Marfaux ; Bouilly ; Serzy-et-Prin ; Chaumuzy ; Treslon ; Poilly ; Arcis-le-Ponsart ; Faverolles-et-Coëmy ; Méry-Prémecy ; Sarcy ; Savigny-sur-Ardres ; Mont-sur-Courville ; Crugny ; Courville ; Aubilly</p>	<p>dans les vallons. Des bois de pente, prairies, pelouses et broussailles se partagent les coteaux. Cette vaste ZNIEFF présente, selon les secteurs, un bon état à un état précaire, l'occupation des sols de la vallée ayant nettement évolué au cours des dernières décennies, avec le développement des cultures (aux dépens des prairies) et la raréfaction des zones humides (drainées ou encore recolonisées naturellement par la forêt). Une partie de la ZNIEFF est incluse dans le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims.</p>	<p><i>obstetricans</i> ; Rainette verte <i>Hyla arborea</i> ; Salamandre tachetée <i>Salamandra salamandra</i> ; Triton crêté <i>Triturus cristatus</i></p> <p><u>Crustacés</u> : L'Écrevisse à pieds blancs <i>Austropotamobius pallipes</i></p> <p><u>Mammifères</u> : Loutre d'Europe <i>Lutra lutra</i> ; Putois d'Europe, Furet <i>Mustela putorius</i> ; Murin de Bechstein <i>Myotis bechsteini</i> ; Murin de Daubenton <i>Myotis daubentoni</i> ; Grand Murin <i>Myotis myotis</i> ; Crossope aquatique <i>Neomys fodiens</i> ; Grand rhinolophe <i>Rhinolophus ferrumequinum</i></p> <p><u>Odonates</u> : La Grande Aeshne <i>Aeshna grandis</i> ; L'Aeshne printanière <i>Brachytron pratense</i> ; L'Épithèque bimaculée <i>Epiptera bimaculata</i> ; La Leucorrhine à gros thorax <i>Leucorrhinia pectoralis</i> ; La Cordulie à taches jaunes <i>Somatochlora flavomaculata</i> ; La Cordulie métallique <i>Somatochlora metallica</i> ; Le Sympétrum noir <i>Sympetrum danae</i> ; Le Sympétrum jaune d'or <i>Sympetrum flaveolum</i></p> <p><u>Oiseaux</u> : Rousserolle verderolle <i>Acrocephalus palustris</i> ; Phragmite des joncs <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> ; Chouette chevêche <i>Athene noctua</i> ; Engoulevent d'Europe <i>Caprimulgus europaeus</i> ; Petit Gravelot <i>Charadrius dubius</i> ; Busard cendré <i>Circus pygargus</i> ; Pigeon colombin <i>Columba oenas</i> ; Faucon hobereau <i>Falco subbuteo</i> ; Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio</i> ; Vanneau huppé <i>Vanellus vanellus</i></p> <p><u>Orthoptères</u> : Criquet verte-échine <i>Chorthippus dorsatus</i> ; Conocéphale des Roseaux <i>Conocephalus dorsalis</i> ; Criquet ensanglanté <i>Mecostethus grossus</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Pâturin rigide <i>Catapodium rigidum</i> ; Chamaecytisus <i>supinus</i> ; Orchis négligé <i>Dactylorhiza praetermissa</i> ; Scirpe à inflorescence ovoïde <i>Eleocharis ovata</i> ; Orchis singe <i>Orchis simia</i> ; Orobanche violette <i>Orobanche amethystea</i> ; Orobanche du trèfle <i>Orobanche minor</i> ; Petite Renouée <i>Polygonum minus</i> ; Potamot à feuilles aiguës <i>Potamogeton acutifolius</i> ; Potamot à tige comprimée <i>Potamogeton compressus</i> ; Potamot à feuilles obtuses <i>Potamogeton obtusifolius</i> ; Grande douve <i>Ranunculus lingua</i> ; Patience des marais <i>Rumex palustris</i> ; Laiteron des marais <i>Sonchus palustris</i> ; Rubanier nain <i>Sparganium minimum</i> ; Stellaire des marais <i>Stellaria palustris</i> ; Pissenlit des marais <i>Taraxacum palustre</i> ; Orme lisse <i>Ulmus</i></p>
--	---	---	---

			<p><i>laevis</i> ; Vulpie ambiguë <i>Vulpia ciliata</i></p> <p><u>Poissons</u> : Chabot <i>Cottus gobio</i> ; Lamproie de Planer <i>Lampetra planeri</i> ; Truite de mer <i>Salmo trutta fario</i></p> <p><u>Ptérédophytes</u> : Fougère des marais <i>Thelypteris palustris</i></p> <p><u>Reptiles</u> : Coronelle lisse <i>Coronella austriaca</i> ; Lézard des souches <i>Lacerta agilis</i></p>
<p><b>Massif Forestier du Mont de Berru</b></p>	<p>Witry-lès-Reims, Nogent-l'Abbesse, Berru, Cernay-lès-Reims</p>	<p>Le Mont de Berru est une butte-témoin détachée de la Côte de l'Île de France (butte avancée de la Montagne de Reims). Elle surplombe d'une centaine de mètres la plaine crayeuse. Un complexe de bois, de broussailles, de pelouses, de petits marais et de mares remarquables recouvre le sommet de la butte et une partie de ses flancs. Il constitue la ZNIEFF de type II appelée Massif forestier du Mont de Berru. Une carrière de sable et des cultures à gibier disséminées font également partie du périmètre. Les principaux types forestiers de la Montagne de Reims sont représentés : chênaie-charmaie neutrophile (groupement dominant), chênaie sessiliflore à luzule de Forster (en limite d'aire) sur les sols acides, chênaie-frênaie sur sols humides tendant localement à l'aulnaie-frênaie sur substrat plus marécageux, chênaie pubescente des versants secs et chauds. La butte-témoin du Mont de Berru, située dans le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, possède un grand intérêt paysager, ainsi qu'un intérêt pédagogique certain. Elle est fréquentée par de nombreux promeneurs et vacanciers. Elle présente également un intérêt géologique, avec ses gisements de fossiles tertiaires bien connus. La ZNIEFF est en bon état, mais est fortement menacée par de nombreux facteurs : piétinement du sol par les nombreux promeneurs, pratique de la moto verte, dynamique naturelle (comblement des mares et envahissement des marais et des pelouses par les broussailles) et plantations de résineux.</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines) ; Prairies à Molinie et communautés associées ; Chênaies acidiphiles ; Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides ; Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Amphibiens</u> : Salamandre tachetée <i>Salamandra salamandra</i> ; Triton crêté <i>Triturus cristatus</i></p> <p><u>Autres insectes</u> : Mante religieuse <i>Mantis religiosa</i></p> <p><u>Mammifères</u> : Barbastelle d'Europe <i>Barbastella barbastellus</i> ; Putois d'Europe, Furet <i>Mustela putorius</i></p> <p><u>Odonates</u> : Le Cordulégastre annelé <i>Cordulegaster boltoni</i></p> <p><u>Oiseaux</u> : Pouillot de Bonelli <i>Phylloscopus bonelli</i></p> <p><u>Orthoptères</u> : Courtilière commune <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Alysson à calice persistant <i>Alyssum alyssoides</i> ; Laiche puce <i>Carex pulicaris</i> ; Cuscute à petites fleurs <i>Cuscuta epithimum</i> ; Orchis négligé <i>Dactylorhiza praetermissa</i> ; Scirpe pauciflore <i>Eleocharis quinqueflora</i> ; Gymnadenie odorante <i>Gymnadenia odoratissima</i> ; Luzule de Forster <i>Luzula forsteri</i> ; Mibora naine <i>Mibora minima</i> ; Oenanthe de Lachenal <i>Oenanthe lachenalii</i> ; Orobanche pourprée <i>Orobanche purpurea</i> ; Pédiculaire des forêts <i>Pedicularis sylvatica</i> ; Grassette commune <i>Pinguicula vulgaris</i> ; Potamot des tourbières alcalines <i>Potamogeton coloratus</i> ; Chêne pubescent <i>Quercus pubescens</i> ; Pissenlit des marais <i>Taraxacum palustre</i> ; Molène blattaire</p>

			<p><i>Verbascum blattaria</i></p> <p><u>Ptéridophytes</u> : Dryoptéris écailleux <i>Dryopteris affinis subsp. affinis</i> ; Ophioglosse commun <i>Ophioglossum vulgatum</i></p> <p><u>Reptiles</u> : Lézard des souches <i>Lacerta agilis</i> ; Lézard à deux raies <i>Lacerta viridis</i></p>
<p><b>Pelouses et bois du camp militaire de Moronvilliers</b></p>	<p>Saint-Martin-l'Heureux, Saint-Hilaire-le-Petit, Beine-Nauroy, Prosnes, Pontfaverger-Moronvilliers</p>	<p>Le Camp de Moronvilliers est un des quatre camps militaires de la Champagne crayeuse ; il constitue un vaste ensemble semi-naturel isolé au milieu d'un paysage de grandes cultures. Territoire militaire depuis la fin de la première guerre mondiale, la végétation y a évolué assez librement depuis 75 ans. Cette ZNIEFF de type II de 2 664 hectares comprend de vastes pelouses calcaires entrecoupées de broussailles calcicoles, de boisements feuillus et de pinèdes de pins noirs ou de pins sylvestres, d'origine humaine (plantées) ou spontanée (implantation naturelle par essaimage des pins). D'autres biotopes sont à noter et notamment des zones érodées peuplées par une végétation pionnière et des petits éboulis crayeux. Cette ZNIEFF, constituant un très beau milieu naturel (identifiée par le Muséum National d'Histoire Naturel comme susceptible d'être intégrée au réseau Natura 2000 au titre de la directive Habitats) est dans un très bon état de conservation.</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Pelouses pionnières médio-européennes ; Forêts de Pins sylvestres ; Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles ; Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides ; Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</p> <p><b>Espèces</b></p> <p><u>Autres insectes</u> : Mante religieuse <i>Mantis religiosa</i></p> <p><u>Lépidoptères</u> : L'Hermitte <i>Chazara briseis</i> ; L'Agreste <i>Hipparchia semele</i> ; Le Flambé <i>Iphiclides podalirius</i> ; L'Azuré de la Croisette <i>Maculinea alcon rebeli</i> ; Le Machaon <i>Papilio machaon</i> ; La Thécla du Prunier <i>Strymonidia pruni</i></p> <p><u>Oiseaux</u> : Pigeon colombin <i>Columba oenas</i> ; Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio</i> ; Alouette lulu <i>Lullula arborea</i></p> <p><u>Orthoptères</u> : Caloptène italien <i>Calliptamus italicus</i> ; Dectique verrucivore <i>Decticus verrucivorus</i> ; Ehippigère des vignes <i>Ehippiger ehippiger</i> ; Oedipode turquoise <i>Oedipoda caerulea</i> ; Decticelle grisâtre <i>Platycleis albopunctata</i> ; Tétrix des carrières <i>Tetrix nutans</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Alysso à calice persistant <i>Alyssum alyssoides</i> ; Laser à feuilles larges <i>Laserpitium latifolium</i> ; Lin des Alpes <i>Linum leonii</i> ; Ophrys abeille <i>Ophrys sphegodes</i> ; Chêne pubescent <i>Quercus pubescens</i></p> <p><u>Reptiles</u> : Lézard des souches <i>Lacerta agilis</i></p>
<p><b>Massif Forestier de la Montagne de Reims (Versant Sud) et Etangs associés</b></p>	<p>Villers-Marmery ; Mailly-Champagne ; Verzenay ; Ville-en-Selve ; Verzy ; Trépail ; Ludes ;</p>	<p>D'une superficie de 4854 hectares, son périmètre a été profondément modifié en 2000 et fortement agrandi afin d'y englober toutes les ZNIEFF de type I présentes sur le versant du massif forestier couvrant la partie sud de la Montagne de Reims (en tout 10 ZNIEFF dont les carrières à chauves-souris du Mont-Hurlet). Sa situation</p>	<p><b>Habitats</b></p> <p>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens ; Chênaies acidiphiles ; Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles ; Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides ; Hêtraies sur calcaire</p> <p><b>Espèces</b></p>

		<p>géologique et topographique y détermine des biotopes variés et permet l'installation d'une végétation diversifiée : forêts acidiphiles (avec landes relictuelles et marais associés), forêts neutrophiles, bois marécageux, forêts thermophiles (avec ourlets et pelouses associés). Ce dernier type, localisé sur les pentes escarpées les mieux exposées, constitue l'élément le plus remarquable de la ZNIEFF par la présence d'espèces rares et souvent protégées. Les étangs et les mares souvent situés à la périphérie du massif ont également été pris en compte : ils regroupent des habitats aquatiques et marécageux très intéressants avec une faune associée riche et diversifiée. Le réseau des anciennes carrières souterraines d'Avenay-Val-d'Or constitue un site d'hivernage majeur pour sept espèces rares et vulnérables de Chiroptères. On note également la présence de formations karstiques (dolines, résurgences et ruisseau souterrain) et tufeuses (de très faible extension spatiale). Des plantations de pins, quelques cultures et prairies complètent l'inventaire des milieux présents dans cette ZNIEFF.</p> <p>La ZNIEFF est dans un bon état général. Une grande partie du massif forestier a été inscrit au titre de la directive Habitats pour rejoindre le réseau Natura 2000.</p>	<p><u>Amphibiens</u> : Sonneur à ventre jaune <i>Bombina variegata</i> ; Salamandre tachetée <i>Salamandra salamandra</i> ; Triton crêté <i>Triturus cristatus</i></p> <p><u>Coléoptères</u> : Lucane Cerf-volant (mâle) ou Grande biche (femelle) <i>Lucanus cervus</i></p> <p><u>Lépidoptères</u> : L'Ecureuil <i>Stauropus fagi</i></p> <p><u>Mammifères</u> : Murin de Bechstein <i>Myotis bechsteini</i> ; Murin de Daubenton <i>Myotis daubentoni</i> ; Murin à oreilles échancrées <i>Myotis emarginatus</i> ; Grand Murin <i>Myotis myotis</i> ; Murin à moustaches <i>Myotis mystacinus</i> ; Murin de Natterer <i>Myotis nattereri</i> ; Crossope aquatique <i>Neomys fodiens</i> ; Oreillard roux <i>Plecotus auritus</i></p> <p><u>Odonates</u> : La Leucorrhine à gros thorax <i>Leucorrhinia pectoralis</i></p> <p><u>Phanérogames</u> : Lychnis Nielle <i>Agrostemma githago</i> ; Aristoloche clématite <i>Aristolochia clematitis</i> ; Asaret <i>Asarum europaeum</i> ; Marguerite de la Saint-Michel <i>Aster amellus</i> ; Laïche des montagnes <i>Carex montana</i> ; Laïche pied-d'oiseau <i>Carex ornithopoda</i> ; Céphalanthère à feuilles étroites <i>Cephalanthera longifolia</i> ; Céphalanthère rouge <i>Cephalanthera rubra</i> ; <i>Chamaecytisus supinus</i> ; Cuscute à petites fleurs <i>Cuscuta epithimum</i> ; Rossolis à feuilles rondes <i>Drosera rotundifolia</i> ; Scirpe à inflorescence ovoïde <i>Eleocharis ovata</i> ; Épipactis à petites feuilles <i>Epipactis microphylla</i> ; Épipactis pourpre <i>Epipactis purpurata</i> ; Filipendule vulgaire <i>Filipendula vulgaris</i> ; Gaillet de Fleurot <i>Galium fleurotii</i> ; Gypsophile des murailles <i>Gypsophila muralis</i> ; Laser à feuilles larges <i>Laserpitium latifolium</i> ; Limodore avorté <i>Limodorum abortivum</i> ; Lin des Alpes <i>Linum leonii</i> ; Ophrys abeille <i>Ophrys sphegodes</i> ; Peucedan Herbe aux cerfs <i>Peucedanum cervaria</i> ; Raïponce noire <i>Phyteuma nigrum</i> ; Pyrole moyenne <i>Pyrola media</i> ; Petite pyrole <i>Pyrola minor</i> ; Chêne pubescent <i>Quercus pubescens</i> ; Saule à feuilles étroites <i>Salix repens</i> ; Alisier de Fontainebleau <i>Sorbus latifolia</i> ; Rubanier nain <i>Sparganium minimum</i> ; Orme lisse <i>Ulmus laevis</i> ; Violette des sables <i>Viola rupestris</i></p> <p><u>Ptéridophytes</u> : Fougère des marais <i>Thelypteris palustris</i></p> <p><u>Reptiles</u> : Lézard des souches <i>Lacerta agilis</i></p>
--	--	---	--